

Zorgen rond PEG sonde en vervanging PEG sonde (Percutane Endoscopische Gastrostomie)

Een PEG-sonde laat toe om een volwaardige (vloeibare) voeding, rechtstreeks in de maag te brengen indien dit niet meer via de normale weg kan gebeuren.

De PEG-sonde geeft rechtstreeks toegang tot de maag. Via deze sonde kunnen sondevoeding, water en (sommige) geneesmiddelen toegediend worden.

De sonde wordt door een arts geplaatst met behulp van een gastroscoop. Via de buikwand wordt de PEG-sonde vanuit de maag naar buiten gebracht. Dit gebeurt meestal onder lokale verdoving en de hele procedure duurt ongeveer 30 minuten.

De nazorg gebeurt door de (thuis)verpleegkundige, waarbij een nauwgezette inspectie van de huid rond de sonde vereist is.

Eveneens zal de sonde moeten 'gedompeld' en gespoeld worden en in sommige dringende situaties herplaatst worden, door de verpleegkundige.

Contact:

Walter De Vleeschhouwer
Erwin Van der Heggen

info@wondkompas.be
www.wondkompas.be

Doel:

Inzicht bijbrengen in het waarom en hoe een PEG-sonde geplaatst wordt door de arts. De verschillende technieken, PUSH en PULL techniek, worden op didactische wijze getoond.

Het belang van de centrale rol voor de (thuis)verpleegkundige in de onmiddellijke nazorg en de zorg op termijn, van een patiënt met een PEG-sonde.

Doelgroep:

Verpleegkundigen in de thuiszorg

Inhoud:

- Het plaatsen van de PEG-sonde: PUSH en PULL techniek.
- Indicaties en complicaties.
- Het spoelen en het dompelen van de sonde: waarom en hoe.
- Vervangen van een PEG-sonde met ballon.
- Zorg van de huid rondom de insteekplaats met casus bespreking.

We zorgen voor een evenwichtige balans van het theoretisch deel en de casuïstiek uit onze praktijk.

We zorgen voor digitale hand-outs.

Locatie

We vragen aan onze cliënten om voorzieningen te treffen voor een vergaderzaal met witte muur of projectiescherm.

Wij brengen laptop en beamer mee.